

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

新ミヤリサンアイジ[®]整腸薬

新ミヤリサンアイジ整腸薬は、酪酸菌（宮入菌）にビタミンB₂とB₆を加えた3ヵ月以上の乳幼児から成人まで幅広く服用できる整腸薬です。芽胞と呼ばれる耐久性の高い細胞構造を形成する酪酸菌（宮入菌）は、生きたまま腸まで届き、腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。

⚠ 使用上の注意

【相談すること】



1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている方。
2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

効能又は効果

整腸（便通を整える）、軟便、便秘、腹部膨満感

用法及び用量

下記の1回量を1日3回、食後に服用してください。

年 齢	服用量（1回量）
成人（15歳以上）	1.8 g
8歳以上15歳未満	1.5 g
5歳以上8歳未満	0.9 g
1歳以上5歳未満	0.6 g
3ヵ月以上1歳未満	0.3 g
3ヵ月未満	服用しないでください



箱の中の計量サジ（すりきり一杯0.3 g）をお使いください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

5.4 g (15歳以上の1日量) 中

成分	含量	はたらき
宮入菌末	162mg	腸内において発育し、有機酸（酪酸、酢酸）並びにビタミンB群を産生し、腸内有益菌（ビフィズス菌・乳酸菌）の発育を助長し、腐敗や異常発酵の原因になる有害細菌の発育を抑制して腸の働きを正常にします。
リボフラビン (ビタミンB ₂)	7.2mg	消耗したビタミンを補給します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	28.8mg	

添加物としてパレイショデンプン、乳糖水和物、白糖、ラクチトール、クエン酸水和物を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

包装

40 g

この製品についてのお問い合わせ先

本製品について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

ミヤリサン製薬株式会社 お客様相談室

住 所：東京都北区上中里1-10-3

電 話：(03)3917-1191

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

Miyarisan ミヤリサン製薬株式会社

長野県埴科郡坂城町中之条102番地15