

動物用医薬品

止瀉・消化器疾患改善剤
動物用ミヤリサン[®]
 生薬配合

【成分及び分量】

有効成分	含量(1g中)
沈降炭酸カルシウム	680mg
オウバク末	80mg

その他、本剤は、宮入菌末、ゲンノショウコ末、トウモロコシデンブ、人工カルルス塩、乳糖水和物を含む。

【効能又は効果】

下痢における症状改善
 消化器疾患、消化器衰弱、食欲不振における症状改善

【用法及び用量】

下記の分量を1日1～3回内服もしくは飼料、人工乳、飲水等に混ぜて投与する。

動物種	体重	用量*	動物種	体重	用量*
牛	300kg以上	80g	犬	20kg以上	1.3g
	100～300kg	40g		5～20kg	0.6g
	100kg以下	20g		5kg以下	0.3g
馬	300kg以上	50g	猫	3kg以上	0.2g
	100～300kg	25g		1～3kg	0.1g
	100kg以下	12g		1kg以下	0.05g
豚 緬・山羊	100kg以上	15g	鶏	大すう、成鶏 中すう 幼すう	0.1g
	30～100kg	7.5g			0.05g
	10～30kg	5g			0.025g
	10kg以下	3g			

* 用量は1回投与量を示します。

【包装】

500 g (50 g × 10包)

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。

(使用者に対する注意)

- 作業時には、防護メガネ、マスク、手袋等の防護具を着用し、眼、鼻、口等に入らないよう注意すること。

(取扱い及び廃棄に関する注意)

- 本剤は湿気の多い場所、温度の高い場所並びに直射日光を避けて保管すること。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないこと。
- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

(対象動物に関する注意)

- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

【製品情報お問い合わせ先】

ミヤリサン製薬株式会社 お客様相談室
〒114-0016 東京都北区上中里1-10-3
TEL：03-3917-1191

製造販売元

miyarisan ミヤリサン製薬株式会社

長野県埴科郡坂城町中之条102-15

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。